

培育和投饵量对长牡蛎壳黑选育品系幼虫生长存活及附着变态的影响*

种金豆¹, 李琪^{1,2**}, 王涛¹

(1. 海水养殖教育部重点实验室(中国海洋大学), 山东 青岛 266003;
2. 海洋科学与技术国家实验室, 海洋渔业科学与食物产出过程功能实验室, 山东 青岛 266200)

为探究长牡蛎(*Crassostrea gigas*)壳黑选育品系规模化繁育适宜的培育密度和投饵量,本研究以长牡蛎野生群不同培育密度(3、7和15个/mL)和不同初始投饵量(0.4、0.8和 1.6×10^3 cells \cdot ind⁻¹ \cdot d⁻¹)对长牡蛎幼虫生长、存活及附着的影响。研究显示,培育密度和投饵量对长牡蛎幼虫的生长速率、存活率和附着率均有显著影响($P < 0.05$)。在培育密度3和7个/mL实验组,长牡蛎幼虫生长速率随投饵量增加而显著增大($P < 0.05$)。而在培育密度15个/mL实验组,投饵量对生长速率无显著影响($P > 0.05$)。且在培育密度15个/mL、投饵量 1.6×10^3 cells \cdot ind⁻¹ \cdot d⁻¹实验组达到最大值。而在培育密度15个/mL实验组,投饵量对幼虫存活率和附着率最低。但在培育密度15个/mL实验组长牡蛎壳黑选育品系幼虫的壳高始终显著高于投饵量 0.4×10^3 cells \cdot ind⁻¹ \cdot d⁻¹实验组外,长牡蛎壳黑选育品系幼虫生长速率、存活率和附着率均显著高于野生群体。研究结果表明,长牡蛎壳黑选育品系幼虫最适培育条件为培育密度7个/mL、投饵量 1.6×10^3 cells \cdot ind⁻¹ \cdot d⁻¹,增加投饵量可促进长牡蛎幼虫生长,但过高的培育密度会与投饵量产生拮抗作用,抑制幼虫生长及附着。与长牡蛎野生群体相比,壳黑选育品系幼虫能适应更高的培育密度环境,在饵料充足的条件下附着性状均优于野生群体。

关键词: 壳黑选育品系; 幼虫; 培育密度; 投饵量; 生长; 存活; 附着

中图分类号: S 8.3 文献标志码: A 文章编号: 1672-5174(2019)02-021-09

doi: 10.11840/j.issn.1672-5174.20180096

李琪, 王涛. 培育密度和投饵量对长牡蛎壳黑选育品系幼虫生长存活及附着变态的影响[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版), 2019, 49(2): 21-29.

LI Qi, WANG Tao. Effects of stocking density and algal ration on growth, survival and settlement of *Crassostrea gigas* black shell line larvae[J]. Periodical of Ocean University of China, 2019, 49(2): 21-29.

长牡蛎(*Crassostrea gigas*)也称太平洋牡蛎,自然分布于我国渤海、黄海和东海海域,具有生长速度快、养殖成本较低、适应性广、抗逆性强等特点,是世界性海产贝类养殖种类之一,具有巨大的养殖规模和经济价值,目前已成为我国沿海地区重要经济性状良种选育研究已较为广泛。壳色是经济贝类的一个重要经济性状,受消费者青睐,也可以显著提高其商品价值。贝类壳色在海水养殖经济贝类中普遍存在^[4-6]。长牡蛎壳色受遗传因素影响且遗传力较高,经人工选育可实现

对壳色的纯化^[7-8]。采用家系选育和群体选育的混合选育技术,我们培育出左右壳均为黑色、遗传稳定的长牡蛎壳色新品系。该新选育品系不仅具靓丽的外观,还具有生长快、抗逆性强等优点,具有巨大的产业推广价值。长牡蛎壳黑选育品系的产业化应用对于促进牡蛎养殖业良种化具有重要的意义。

幼虫培育是苗种规模化繁育工作的核心,也是成贝健康生长的重要基础。双壳贝类受精卵孵化后进入营浮游生活的幼虫期,浮游期贝类幼虫的发育由早期依赖自身卵黄和外源饵料的混合型营养迅速变为单纯

基金项目:泰山学者种业计划专家项目;国家自然科学基金项目(31772843);青岛市产业培育计划项目(17-3-3-64-nsh);山东省科技发展计划项目(2016ZDJS06A06)资助

Supported by Taishan Scholar Seed Industry Experts Project; National Natural Science Foundation of China (31772843); Industry Development Projects of Qingdao City (17-3-3-64-nsh); Science and Technology Development Project of Shandong Province (2016ZDJS06A06)

收稿日期:2018-03-08;修订日期:2018-05-22

作者简介:种金豆(1993-),男,硕士生。E-mail:chongjindou@stu.ouc.edu.cn

通讯作者:E-mail:qili66@ouc.edu.cn

营养^[9]。可见,投饵量是贝类附着变态的重要因素^[10]。贝类幼虫生长和存活也与幼虫培育密度,其投饵量密切相关。研究表明培育密度和投饵量之间存在负相关关系。Marshall 等^[19]研究增加对幼虫生长存活存在一定影响,密度会与投饵量产生拮抗作用,确定适宜的培育密度和投饵量是贝类育苗的关键技术问题。

以野生群体幼虫为对照组,研究投饵量对长牡蛎壳黑选育品系幼虫生长与存活性状的影响,旨在阐明长牡蛎壳黑选育品系幼虫生长与存活性状差异与投饵量的关系,为长牡蛎壳黑选育品系幼虫培育提供理论依据。

以山东荣成海域养殖的第 7 代长牡蛎壳黑选左右壳均为黑色个体作为亲本,选取长牡蛎亲贝作为对照组,进

表 1

Daily feed ration for larvae rearing

组别 Group	第 1~5 天 Day 1~5
	0.4
	0.8
	1.6

各实验组随机取 10 只,测量壳高

量为景
VA)。...
时,对数据

实验期间, 随日龄增加幼虫规格逐渐增大, 最适培育条件逐步发生变化。第 15 和 20 天, 长牡蛎壳黑品系与野生群体的壳顶幼虫和眼点幼虫壳高均在培育密度 7 个/mL, 投饵量 $1.6 \times 10^3 \text{ cells} \cdot \text{ind}^{-1} \text{ d}^{-1}$ 实验组达到最大值, 显著高于其它实验组 ($P < 0.05$)。此外, 在培育密度 15 个/mL 实验组壳黑选育品系各时期幼虫壳

高始终高于野生群体幼虫。

培育密度对长牡蛎野生群体幼虫生长速率有显著影响 ($P < 0.05$), 对长牡蛎壳黑品系幼虫影响不显著 ($P > 0.05$), 培育密度和投饵量对长牡蛎幼虫生长速率存在显著交互作用 ($P < 0.05$) (见表 3)。在培育密度 3 和 7 个/mL 实验组, 随投饵量增加长牡蛎幼虫生

表 2 不同培育密度和投饵量对壳黑选育品系和野生群体幼虫壳高生长的影响
Table 2 Growth of black shell color strain and wild population of *Crassostrea gigas* larvae reared under different combinations of stocking density and feed ration

实验组 ^①	5 d		10 d		15 d		20 d	
	壳黑品系 ^②	野生群体 ^③	壳黑品系 ^②	野生群体 ^③	壳黑品系 ^②	野生群体 ^③	壳黑品系 ^②	野生群体 ^③
3 × 0.4	89.93 ± 1.58 ^a	91.43 ± 1.09 ^C	110.00 ± 2.64 ^a	106.21 ± 3.63 ^A	138.86 ± 2.75 ^a	146.87 ± 4.25 ^A	213.16 ± 3.68 ^a	195.00 ± 4.58 ^{A*}
3 × 0.8	95.00 ± 0.26 ^{ab}	91.9 ± 0.93 ^C	128.33 ± 3.05 ^b	117.60 ± 4.96 ^{B*}	162.00 ± 2.64 ^{bc}	149.63 ± 3.50 ^{A*}	243.67 ± 5.13 ^{bc}	235.67 ± 5.51 ^B
3 × 1.6	99.8 ± 0.55 ^{bcd}	99.10 ± 1.04 ^D	124.00 ± 4.58 ^b	126.02 ± 1.96 ^{BC}	164.39 ± 7.00 ^c	152.56 ± 2.89 ^{AB}	262.27 ± 4.06 ^c	237.67 ± 667 ^{B*}
7 × 0.4	97.50 ± 2.51 ^{bc}	91.93 ± 0.15 ^{C*}	109.33 ± 2.51 ^a	137.54 ± 1.71 ^{DE*}	151.05 ± 1.68 ^b	164.23 ± 5.19 ^{BC*}	221.33 ± 17.21 ^{ab}	233.00 ± 3.61 ^{B*}
7 × 0.8	105.00 ± 0.70 ^{de}	89.05 ± 3.47 ^{BC*}	123.33 ± 3.51 ^b	140.51 ± 2.35 ^{E*}	190.17 ± 1.14 ^{de}	173.46 ± 3.09 ^{C*}	256.33 ± 14.57 ^c	242.67 ± 9.50 ^B
7 × 1.6	105.56 ± 0.68 ^c	91.36 ± 1.54 ^{C*}	136.66 ± 0.57 ^c	122.84 ± 3.86 ^{BC*}	233.00 ± 5.29 ^f	221.28 ± 1.12 ^{D*}	284.67 ± 13.57 ^d	271.67 ± 16.56 ^C
15 × 0.4	102.60 ± 2.36 ^{cd}	87.05 ± 1.88 ^{ABC*}	123.33 ± 3.51 ^b	117.90 ± 5.38 ^B	180.33 ± 7.02 ^d	163.95 ± 1.69 ^{BC*}	237.67 ± 5.50 ^{abc}	227.00 ± 5.57 ^B
15 × 0.8	103.36 ± 0.92 ^{de}	85.04 ± 0.97 ^{AB*}	142.00 ± 1.00 ^c	131.10 ± 1.05 ^{CDE*}	200.67 ± 3.65 ^e	166.37 ± 7.24 ^{C*}	252.67 ± 2.08 ^c	238.00 ± 2.65 ^{B*}
15 × 1.6	107.70 ± 3.97 ^e	82.88 ± 2.29 ^{A*}	141.66 ± 1.52 ^c	129.57 ± 2.65 ^{CD*}	191.99 ± 1.80 ^{de}	168.33 ± 4.50 ^{C*}	251.33 ± 7.64 ^c	246.67 ± 3.79 ^B

注: 3、7 和 15 表示培育密度; 0.4、0.8 和 1.6 表示投饵量。同一列数据标注不同上标字母代表差异显著 ($P < 0.05$); * 表示同一实验组两个群体间差异显著 ($P < 0.05$)。

Note: 3, 7 and 15 represented stocking density, 0.4, 0.8, and 1.6 represented algal ration. The different superscript letters of same column values are significantly ($P < 0.05$), * means significant difference ($P < 0.05$) between black shell color strain and wild groups at the same treatments.


① Experimental groups; ② Black shell strain; ③ Wild population

表 3 培育密度和投饵量对长牡蛎壳黑品系与野生群体幼虫生长速率、存活率及附着率影响的方差分析
Table 3 Two-way ANOVA comparing the effect of stocking density and algal feed ration on growth survival and settlement rate of black shell color strain and wild population of *C. gigas* larvae

	方差来源 Source of variation	自由度 df	壳黑品系 Black strain			野生群体 Wild population		
			均方 MS	F	P	均方 MS	F	P
生长速率/ $\mu\text{m} \cdot \text{d}^{-1}$ Growth rate	培育密度 Density	2	0.703	3.026	0.074	3.234	25.035	0.000*
	投饵量 Feed rate	2	8.294	35.687	0.000*	5.350	41.418	0.000*
	培育密度 × 投饵量 Density × feed rate	4	1.091	4.693	0.009*	0.678	5.246	0.006*
存活率/% Survival rate	培育密度 Density	2	0.055	7.982	0.003*	0.057	8.605	0.002*
	投饵量 Feed rate	2	0.147	21.515	0.000*	0.013	2.031	0.160
	培育密度 × 投饵量 Density × feed rate	4	0.061	8.866	0.000*	0.022	3.291	0.034*
附着率/% Settlement rate	培育密度 Density	2	0.164	92.087	0.000*	0.500	133.960	0.000*
	投饵量 Feed rate	2	0.088	49.260	0.000*	0.093	24.940	0.000*
	培育密度 × 投饵量 Density × feed rate	4	0.023	12.837	0.000*	0.052	13.880	0.000*

注: * 表示差异显著 ($P < 0.05$)。

Note: Significant differences are denoted by asterisks ($P < 0.05$).



(3, 7 和 15 表示培育密度为 3, 7 和 15 个/mL, 0.4, 0.8 和 1.6 表示初始投饵量为 0.4×10^3 , 0.8×10^3 和 1.6×10^3 cells \cdot ind $^{-1} \cdot$ d $^{-1}$, * 表示差异显著 ($P < 0.05$)。下同。Stocking density of 3, 7 and 15 inds \cdot mL $^{-1}$ be represented as 3, 7 and 15. Initial feed ration of 0.4×10^3 , 0.8×10^3 and 1.6×10^3 cells \cdot ind $^{-1} \cdot$ d $^{-1}$ be represented as 0.4, 0.8 and 1.6. Significant differences are denoted by asterisks ($P < 0.05$). The same as below.)

图 1 不同培育密度和投饵量对壳黑品系和野生群体幼虫生长速率的影响

Fig. 1 Growth rates of black shell color strain and wild population of *C. gigas* larvae at different larval stocking density and algal feed ration

长速率显著增大 ($P < 0.05$), 并在培育密度 7 个/mL、投饵量 1.6×10^3 cells \cdot ind $^{-1} \cdot$ d $^{-1}$ 实验组, 长牡蛎壳黑品系和野生群体幼虫生长速率均达到最大值, 分别为 $(9.80 \pm 0.62) \mu\text{m} \cdot \text{d}^{-1}$ 和 $(9.30 \pm 0.75) \mu\text{m} \cdot \text{d}^{-1}$ (见图 1)。而在培育密度 15 个/mL 实验组, 投饵量增加对幼虫生长速率无显著影响 ($P > 0.05$), 且各饵料投喂组生长速率均显著低于培育密度 7 个/mL、投饵量 1.6×10^3 cells \cdot ind $^{-1} \cdot$ d $^{-1}$ 实验组 ($P > 0.05$)。除培育密度 7 个/mL、投饵量 0.4×10^3 cells \cdot ind $^{-1} \cdot$ d $^{-1}$ 实验组外, 壳黑品系幼虫生长速率均高于野生群体幼虫。

2.2 培育密度和投饵量对长牡蛎幼虫存活率的影响

培育密度和投饵量对长牡蛎幼虫存活率存在显著交互作用 ($P < 0.05$), 投饵量对长牡蛎壳黑品系幼虫存活率影响显著 ($P < 0.05$), 对长牡蛎野生群体幼虫存活率无显著影响 ($P > 0.05$) (见表 3)。在培育密度 3 和 15 个/mL 实验组, 随投饵量增加壳黑品系幼虫存活率先升高后下降, 野生群体幼虫各饵料投喂组间差异不显著 ($P > 0.05$) (见图 2)。在培育密度 3 个/mL, 投饵量 0.8×10^3 cells \cdot ind $^{-1} \cdot$ d $^{-1}$ 实验组, 壳黑品系幼虫存活率为 69.58%, 显著高于其它实验组 ($P < 0.05$), 最终幼虫存活数量为 2.09 个/mL。在培育密度 15 个/mL、投饵量 1.6×10^3 cells \cdot ind $^{-1} \cdot$ d $^{-1}$ 实验组, 长牡蛎壳黑选育品系和野生群体幼虫存活率最低, 分别为 23.01% 和 11.43%, 最终幼虫存活数量分别为 3.45 和 1.71 个/mL。在培育密度 7 个/mL 实验组, 长

牡蛎幼虫各饵料投喂组间差异不显著 ($P > 0.05$)。在培育密度 7 个/mL、投饵量 1.6×10^3 cells \cdot ind $^{-1} \cdot$ d $^{-1}$ 实验组壳黑选育品系幼虫存活率为 45.83%, 最终幼虫存活数量为 3.21 个/mL; 两群体比较中, 除培育密度 3 个/mL、投饵量 0.4×10^3 cells \cdot ind $^{-1} \cdot$ d $^{-1}$ 实验组外, 壳黑选育品系幼虫存活率均高于野生群体幼虫。

2.3 培育密度和投饵量对长牡蛎幼虫附着率的影响

培育密度和投饵量对长牡蛎幼虫附着率有显著交互作用 ($P < 0.05$) (见表 3)。在培育密度 3 个/mL 实验组, 随投饵量增加长牡蛎壳黑品系幼虫附着率先升高后下降, 并在投饵量 0.8×10^3 cells \cdot ind $^{-1} \cdot$ d $^{-1}$ 实验组长牡蛎壳黑品系幼虫附着率显著高于其它实验组 ($P < 0.05$); 在培育密度 7 个/mL 实验组, 随投饵量增加长牡蛎壳黑品系幼虫附着率增大, 长牡蛎野生群体幼虫附着率各饵料实验组间差异不显著 ($P > 0.05$)。随培育密度增加, 长牡蛎壳黑品系幼虫附着率逐步降低。在培育密度 15 个/mL, 投饵量 1.6×10^3 cells \cdot ind $^{-1} \cdot$ d $^{-1}$ 实验组, 长牡蛎壳黑品系幼虫附着率最低。且培育密度 15 个/mL 实验组, 随投饵量增加长牡蛎野生群体幼虫附着率显著降低 ($P < 0.05$) (见图 3)。除培育密度 7 个/mL、投饵量 0.4×10^3 cells \cdot ind $^{-1} \cdot$ d $^{-1}$ 和培育密度 15 个/mL、投饵量 0.4×10^3 cells \cdot ind $^{-1} \cdot$ d $^{-1}$ 实验组外, 长牡蛎壳黑品系幼虫附着率均高于野生群体。




图 2 不同培育密度和投饵量对壳黑品系和野生群体幼虫存活率的影响

Fig. 2 Survival rates of black shell color strain and wild population of *C. gigas* larvae at different larval stocking density and algal feed ration

mar




图 3 不同培育密度和投饵量对壳黑品系和野生群体幼虫附着率的影响

Fig. 3 Settlement rates of black shell color strain and wild population of *C. gigas* larvae at different larval stocking density and algal feed ration

3. 讨论

3.1 培育密度与投饵量对长牡蛎幼虫生长、存活和附着的影响

在适宜范围内, 增加培育密度和投饵量会增大贝类幼虫与饵料的相碰机率, 提高幼虫的摄食效率, 降低摄食行为所造成的能量消耗, 对贝类幼虫的生长有促进作用^[18-19]。本研究结果表明, 在培育密度 3 和 7 个/mL 实验组, 随投饵量增加长牡蛎幼虫生长速率显著增大, 并在培育密度 7 个/mL、投饵量 $1.6 \times 10^3 \text{ cells} \cdot \text{ind}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ 实验组长牡蛎幼虫生长速率最高。而在培育密度 15 个/mL 实验组, 投饵量增加对长牡蛎幼虫生长速率没有显著影响。这表明高培育密度和饵料量之间存在拮抗作用, 对长牡蛎幼虫生长速率产生影响。相似的

研究结果在珠母贝 (*Pinctada margaritifera*)

幼虫到壳顶幼虫及眼点幼虫!其最适培育密度组由 15 个/mL 降低至 7 个/mL#其原因可能是在培育初期!壳黑品系幼虫规格较小!较高的培育密度环境下!有利于提高幼虫摄食效率#而随着日龄增加!幼虫规格增大!个体间竞争加剧!高培育密度环境不利于幼虫生长#Doroudi 等^[5]也得出相似结果!认为在珠母贝幼虫在 8 日龄时!最适培育密度 3 个/mL!而在 20 日龄时!培育密度应小于 2 个/mL#因此!本研究表明长牡蛎壳黑品系幼虫培育期间!初期较高的培育密度和投饵量有利其快速生长发育!当壳黑品系幼虫壳高超过 $42.00 \pm 1.00 \mu\text{m}$ 时!降低培育密度有利于幼虫生长和存活#

存活率是评价贝类幼虫培育环境的指标!是幼虫对不良环境耐受能力的体现^[5]#本实验结果表明过高培育密度对长牡蛎壳黑品系和野生群体幼虫存活率均产生负面影响!两群体幼虫均在培育密度 15 个/mL(投饵量 $1.6 \times 10^3 \text{ cells) ind}^{-1} \text{ d}^{-1}$) 实验组存活率最低!分别为 23.01% 和 11.43%#相似的研究结论在珠母贝^[5](象拔蚌^[9](毛蚶 & *Scaapharca subcrenata*^[21]) 也有报道#培育密度过高会使水体中溶解氧含量降低!氮氮积累过多#在氮氮浓度较高的环境中!机体生理功能会受到负面影响!不利于贝类幼虫生长存活^[22]#同时!粪便累积败坏水质!加速水中致病原生物及细菌的滋生!导致幼虫存活率下降^[5]#投饵量适量增加可为贝类幼虫提供充足的营养提高存活率#而过高的投饵量会使养殖水体中硝酸盐含量上升!导致幼虫的死亡率升高^[3-24]#

附着变态是贝类由浮游幼虫向稚贝转变的重要发育阶段#当培育环境不适宜时!贝类幼虫会延长附着变态时间!最终导致大量死亡^[5]#因此!附着率的高低是苗种培育工作成功的重要因素#本实验结果表明!投饵量适量增加有利于贝类幼虫附着!但过高的投饵量会使幼虫附着率降低#且随培育密度增大长牡蛎壳黑品系幼虫附着率逐步降低#类似的结果在其它双壳贝类也有报道#Robert 等^[6]研究发现食用牡蛎 & *Ostrea edulis*^[6] 随饵料量增加其附着率先升高后降低#Liu 等^[7]对文蛤 & *Meretrix meretrix*^[7] 研究表明培育密度增加会导致文蛤幼虫附着变态时间的延长#高霄龙等^[1]对毛蚶研究也表明随培育密度增加!不仅毛蚶幼虫附着变态时间被延长!且变态率也逐渐降低#出现此现象的原因可能是适量增加投饵量可补充贝类幼虫附着变态所需的能量!投饵过多会增加残饵导致水质恶化!不利于幼虫附着#高培育密度环境下!因贝类幼虫生长缓慢其附着变态需要更多时间#且存活率实验结果表明在高培育密度环境下长牡蛎幼虫的死亡率会上升!这会进一步降低长牡蛎幼虫附着率#

3.2 长牡蛎壳黑品系与野生群体幼虫的比较

研究表明!不同壳色的同种贝类在生长和存活等性状上存在差异^[8-30]!本研究中也发现培育密度对长牡蛎野生群体幼虫生长速率影响显著!而对长牡蛎壳黑品系幼虫影响不显著#且实验期间!在培育密度 15 个/mL 实验组长牡蛎壳黑品系幼虫壳高始终高于野生群体幼虫#此外!除投饵量 $0.4 \times 10^3 \text{ cells) ind}^{-1} \text{ d}^{-1}$ 实验组外!长牡蛎壳黑品系幼虫生长速率(存活率和附着率均高于野生群体幼虫#这些性状优势可能与累代的人工定向选择有关#人工选择育种对双壳贝类生长(存活和抗病等性状的改良已有诸多报道!国内外已成功培育出长牡蛎^[31](悉尼岩牡蛎^[32](马氏珠母贝 & *Pinctada fucata*^[33]) 和虾夷扇贝 & *Patinopecten yessoensis*^[34]) 等经济贝类的快速生长选育品系*长牡蛎抗疱疹病毒 & *OsHV-1*^[35] 选育系^[35]和悉尼岩牡蛎抗寄生虫病 & *QX*^[36] 选育品系^[36]等培育工作也取得了较好研究成果#

邓传敏等^[7]研究发现长牡蛎壳金选育系的摄食率显著高于普通群体#Bayne 等^[8]对悉尼岩牡蛎研究中也发现其快速生长选育系摄食能力显著优于野生群体#这表明双壳贝类选育品系有更高摄食能力!充足的饵料摄食量是发挥其性状优势的前提#本研究也发现投饵量对长牡蛎壳黑品系幼虫存活率影响显著#且在 $0.4 \times 10^3 \text{ cells) ind}^{-1} \text{ d}^{-1}$ 投饵量组!长牡蛎壳黑选育品系幼虫生长速率(存活率与附着率出现低于野生群体幼虫现象!这表明长牡蛎壳黑选育品系幼虫对饵料量有更高的需求!而低饵料投喂量不能为其提供充足的营养需求会导致其生长速率(存活率和附着率降低#

4 结语

本文研究了培育密度和投饵量及其协同作用对长牡蛎壳黑品系和野生群体幼虫的生长(存活及附着变态的影响#结果表明!D 形幼虫时期长牡蛎壳黑选育品系最适培育条件为培育密度 15 个/mL(投饵量 $1.6 \times 10^3 \text{ cells) ind}^{-1} \text{ d}^{-1}$)#但随着幼虫规格的增大!过高的培育密度和饵料量之间存在拮抗作用!并不利于幼虫生长发育#在壳顶幼虫和眼点幼虫时期!其最适培育条件为培育密度 7 个/mL(投饵量 $1.6 \times 10^3 \text{ cells) ind}^{-1} \text{ d}^{-1}$)#相对于野生群体幼虫!壳黑选育品系幼虫有着更高的饵料需求!能适应更高的培育密度环境!其生长(存活和附着性状优于野生群体幼虫#

参考文献 +

- [1] Dégremont L! Garcia C! Jr A S. Genetic improvement for disease resistance in oysters + A review [J]. Journal of Invertebrate Pathology! 2015! 131+226-241.

[2] Langdon C, Evans F, Jacobson D, et al. Yields of cultured pacific oysters

- Lamarck (1819) in suspended culture[J]. *Journal of Shellfish Research*, 1991, 10(1): 47-53.
- [31] 王庆志, 李琪, 孔令锋, 等. 长牡蛎第三代选育群体生长性状的选择效应[J]. *水产学报*, 2013, 37(10): 1487-1494.
Wang Q, Qi LI, Kong L, et al. Third generation evaluation of the Pacific oyster (*Crassostrea gigas*) breeding lines selected for fast growth[J]. *Journal of Fisheries of China*, 2013, 37(10): 1487-1494.
- [32] Nell J A, Perkins B. Evaluation of progeny of fourth generation Sydney rock oyster *Saccostrea glomerata* (Gould, 1850) breeding lines[J]. *Aquaculture Research*, 2015, 36(8): 753-757.
- [33] He M, Guan Y, Yuan T, et al. Realized heritability and response to selection for shell height in the pearl oyster *Pinctada fucata*, (Gould)[J]. *Aquaculture Research*, 2008, 39(8): 801-805.
- [34] Liang J, Zhang G, Zheng H. Divergent selection and realized heritability for growth in the Japanese scallop, *Patinopecten yessoensis* Jay[J]. *Aquaculture Research*, 2010, 41(9): 1315-1321.
- [35] Azéma P, Maurouard E, Lamy J B, et al. The use of size and growing height to improve *Crassostrea gigas*, farming and breeding techniques against OsHV-1[J]. *Aquaculture*, 2017, 471: 121-129.
- [36] Dove M C, Nell J A, O'Connor W A. Evaluation of the progeny of the fourth-generation Sydney rock oyster *Saccostrea glomerata* (Gould, 1850) breeding lines for resistance to QX disease (*Marteilia sydneyi*) and winter mortality (*Bonamia roughleyi*) [J]. *Aquaculture Research*, 2013, 44(11): 1791-1800.
- [37] 邓传敏, 李琪, 孔令锋, 等. 长牡蛎壳金选育系 F₄ 与普通养殖群体摄食和呼吸的比较研究[J]. *中国水产科学*, 2016, 23(4): 855-863.
Deng C M, Qi L I, Kong L, et al. Comparison of feeding and respiration of the forth golden shell colorline and normal culture groups of the Pacific oyster (*Crassostrea gigas*) [J]. *Journal of Fishery Sciences of China*, 2016, 23(4): 855-863.
- [38] Bayne B L. Relations between variable rates of growth, metabolic costs and growth efficiencies in individual Sydney rock oysters (*Saccostrea commercialis*) [J]. *Journal of Experimental Marine Biology & Ecology*, 2000, 251(2): 185-203.

Effects of Stocking Density and Algal Ration On growth, Survival and Settlement of Pacific Oyster (*Crassostrea gigas*) Black Shell Line Larvae

CHONG Jin-Dou¹, LI Qi^{1,2}, WANG Tao¹

(1. The Key Laboratory of Mariculture(Ocean University of China), Ministry of Education, Qingdao 266003, China;2. Laboratory for Marine Fisheries Science and Food Production Processes, Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology, Qingdao 266200, China)

Abstract: The effects of stocking density (3, 7 and 15 larvae \cdot mL⁻¹) and initial algal ration (0.4, 0.8 and 1.6 $\times 10^3$ cells \cdot ind⁻¹ \cdot d⁻¹) on the growth, survival and settlement of black shell lines and wild population of *C. gigas* larvae were investigated. The optimal combination of stocking density and algal ration for Pacific oyster (*C. gigas*) black shell line larvae was determined. Results indicated that the interaction of stocking density and algal ration had significant effects on growth, survival and settlement of *C. gigas* larvae ($P < 0.05$). At 3, 7 inds \cdot mL⁻¹, larval growth rate increased with algal ration. Larval growth rate was the highest in the group of 7 inds \cdot mL⁻¹ and 1.6 $\times 10^3$ cells \cdot ind⁻¹ \cdot d⁻¹ among groups. At 15 inds \cdot mL⁻¹, algal ration had no significant effect on larval growth rate ($P > 0.05$). Under the condition of 15 inds \cdot mL⁻¹ and 1.6 $\times 10^3$ cells \cdot ind⁻¹ \cdot d⁻¹, there were the minimum survival and settlement rates of *C. gigas* black shell line larvae. However, the shell height of black shell line larvae at the density of 15 inds \cdot mL⁻¹ was significantly higher than that of wild larvae ($P < 0.05$). Except the condition of 0.4 $\times 10^3$ cells \cdot ind⁻¹ \cdot d⁻¹, the growth, survival and settlement of black shell line larvae were superior to those of wild larvae, suggesting that black shell line larvae adapted to a higher density, being better than wild larvae in ingestion, growth, survival and settlement. A high stocking density can antagonize the algal ration, thus causes the decrease of growth. The optimum stocking density and algal ration of *C. gigas* black shell line larvae were 7 inds \cdot mL⁻¹ and 1.6 $\times 10^3$ cells \cdot ind⁻¹ \cdot d⁻¹, respectively.

Key words: *Crassostrea gigas*; black shell line; larva; stocking density; algal ration; growth; survival; settlement

责任编辑 朱宝象