

# 长牡蛎转化生长因子受体基因多态性与生长性状和糖原含量的相关性分析

陈! 钰, 李! 琪"" , 于! 红, 孔令锋

(中国海洋大学海水殖教育部重点实验室, 山东 青岛 \$-98#)

摘! 要: 本研究采用' -) A44' 技术, 对长牡蛎(FQ:(; 4D!><) 转化生长因子受体基因(1># FOA3A12) 编码区单核苷酸多态性(41' ) 与来自B 个家系 #8= 个长牡蛎个体的生长性状(壳高、壳长、壳宽、总体量和软体部量) 和糖原含量进行了关联分析。研究表明, 在 1># FOA3A12 基因编码区扩增出的 '=' &K 基因片段中检测到! 个 41' , 其中# 个 41' 位点(5' \$- , " ! &N, " >N) 与经济性状相关; " ! &N 和 " >N 与生长性状和糖原含量均存在显著相关性(C' %9B) , 5' \$- 仅与壳长和软体部重有显著相关性(C' %9B) ; # 个 41' 位点构建得到B 个单倍型, 7&(5. N) 和 7! (-. N) 单倍型的个体在总体重和软体部重上均显著高于其它# 种单倍型的个体。研究结果表明, -\A5NQ1)! \* 基因多态性影响长牡蛎的生长性状和糖原含量, 可用于以后的长牡蛎的分子标记辅助育种和遗传性状的改良。

关键词: 长牡蛎; 转化生长因子受体基因(1># FOA3A12); 生长性状; 糖原; 41' S

中图分类号: ! 4B> #! ! ! ! ! 文献标志码: ! . ! ! ! ! ! 文章编号: ! &' \$! %&' (\$%&' )%#49\$' %6

DOI: ! 8%&' ! &CDEFGHIJK \$%&' # B

引用格式: 陈钰, 李琪, 于红, 等. 长牡蛎转化生长因子受体基因多态性与生长性状和糖原含量的相关性分析[L] < 中国海洋大学学报(自然科学版), \$%&' , ! " (#): \$' ### <

- 7( 1!6P, /\*!dG 62!7VE, Q! :R<' VR?V [HS?!WTF: ESW ?GE\ VaTHWQV 1; QQTV ' \CEQ E!GS: SSVGTVE!aGH \ VaTHIT: GS: E! NRDAQEDVEIETE [ : QQV SWQ! 19: (: 4D!>< [L] < QV GRWV+QE! 2EQSQUWV-HE , \$%&' , ! " (#): \$' ### <

!! 转化生长因子 $1$  (5: ESW ?GE\ VaTHWQV 1, 5NQ1) 超家族是一组在细胞增殖和分化、细胞黏连、骨质再生、胚胎发生、肿瘤发生等过程中具有重要作用的多功能细胞因子<sup>[1]</sup>。5NQ1 超家族成员通过与细胞表面的特异性受体即转化生长因子受体(5: ESW ?GE\ VaTHWQV A1 QQTV, 5NQ1) 结合而发挥作用<sup>[2]</sup>。其中 5NQ1)! \* 作为一个中介物介导信号在细胞外基质中的传导, 从而引起细胞核内基因表达的变化<sup>[3]</sup>。在哺乳动物的研究中, 发现 5NQ1 可通过诱导糖原合成酶激酶的磷酸化作用, 进一步参与该基因的负调控, 进而影响糖原的含量<sup>[4]</sup>, 但在水产动物尚未有 5NQ1 与糖原含量的相关性报道。目前, 在水产动物中已克隆出栉孔扇贝的 5NQ1)! \* 基因, 并通过表达量分析发现该基因可能参与了肌肉的生长调控<sup>[5]</sup>。在长牡蛎中也已克隆出转化生长因子受体基因(1># FOA3A12) 全序列, 并证实编码 -\A5NQ1)! \* 受体蛋白可能在早期

胚胎发育过程中发挥重要作用<sup>[6]</sup>。

长牡蛎(19: (: 4D!><) 又称太平洋牡蛎, 隶属于软体动物门(9VRPSD) 瓣鳃纲(YZ RIG) 牡蛎科(+SA T;G: Q) 巨蛎属(19: (: 4D), 是世界上养殖范围最广、产量最高的经济贝类, 同时具有怀卵量大、繁殖周期短、生长速度快等生物学特性<sup>[7]</sup>。在人工选育过程中, 可通过与长牡蛎基因效应相关的分子标记辅助育种技术来提高长牡蛎生长率, 进而增加牡蛎的产量<sup>[8]</sup>。同时, 长牡蛎作为遗传多样性较高的物种, 也为基因多态性分析提供了便利<sup>[9]</sup>。因此, 可通过分析候选基因的单核苷酸多态性(4ENRQ EPDQVIGQ [VR?V [HS?S, 41' S) 及这些多态位点所构建的单倍型, 来建立表型性状与候选等位基因多态性之间的关联<sup>[10]</sup>, 从而选育出对长牡蛎生长最有利的基因型个体。目前, 在长牡蛎中已经分析了包括淀粉酶基因<sup>[11]</sup>、胰岛素相关多肽基因<sup>[12]</sup>、胰岛素受体相关基因<sup>[13]</sup>、糖原磷酸化酶基

! " ! 基金项目: 国家公益性行业科研专项(\$%&' %9B); 国家自然科学基金项目(#&' \$B); 山东省农业良种工程项目资助 4P [VTQ!KU 1: TVER 9; GE' RKG MQV; Q) SQ; DH'; V: ? (\$%&' %9B); 1: TVER 1: TP: R 4GEQ QPE: TVE WV-HE (#&' \$B); : \GRRPQW!; VQ! OPE GE! W4H E VE!; VZED 收稿日期: \$%&' %9B; 修订日期: \$%&' %9B 作者简介: 陈! 钰(88-), 女, 硕士生, 从事水产动物遗传育种学研究。(A?: GRDHEURGRS: 8\$- DV? ! "" ! 通讯作者:(A?: GRJCS=" VFDQP-E

因<sup>[8]</sup>在内的多种基因多态性与长牡蛎经济性状的相关性,为分子标记辅助育种方法在改良长牡蛎生长及肉质性状的应用奠定了良好的基础。

本研究以长牡蛎转化生长因子受体基因作为候选基因,利用单链构象多态性技术(SSCP; 日! DENV/A ? : TGE [VR?V [H\$?, 44' ) 结合测序方法进行长牡蛎 41' S 的分型和筛选,分析了 1># FOA3A!2 基因单核苷酸多态性与长牡蛎生长和糖原含量性状之间的相关性,旨在为长牡蛎的遗传改良提供理论依据。

## 2 材料与方法

### 2.1 实验材料与 1. 提取

2008 年 1 月从威海长牡蛎养殖群体中选取性腺发育成熟的个体作为亲贝,采用平衡巢式设计构建 10 个全同胞家系。稚贝附着后,将各家系装至扇贝笼中,并挂至乳山海区养成。各组悬挂水层及区域一致,并按长牡蛎养成规范进行管理,尽量减小环境误差,以保证所构建的全同胞家系均饲养于相同条件下。2008 年选取 10 个全同胞家系(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#),取样个数分别为 10、10、10、10、10、10、10、10、10、10,共计 100 个 \$ 龄长牡蛎<sup>[8]</sup>,测定各个体生长数据(壳高(“&B%h&%B)???)

壳长(!B% h" <B%)??;壳宽(\$#<=>h! <B%)??;总质量(#=<=>h& < >)\;软体部重(! <Bh\$%) \)和糖原含量(见表 2)。糖原含量的测定采用蒽酮比色法<sup>[9]</sup>,取经过冷冻干燥处理后的长牡蛎性腺组织 #%? \, 加入 # ? /! # % @ 的氢氧化钾溶液,混匀后放于 80% b 沸水浴 # % ? < E, 迅速放于冰上冷却;取 B // 冷却液稀释至 %B? /, 加入 B ? / 冷却的 % \$ @ 蒽酮硫酸溶液,混匀后进行沸水浴, % ? < E 后取出迅速冷却;在可见分光光度计 = \$ % E ? 波长下进行比色,测其吸光度值;以 % % ^ / ? / 的葡萄糖溶液作为标准,制作标准曲线,并根据测得的吸光度值对应换算出样品的糖原含量。

采集闭壳肌组织放于无水乙醇中, A \$ % b 保存。用苯酚 A 氯仿法<sup>[10]</sup>提取长牡蛎闭壳肌组织, 1. , 在 2% 琼脂糖凝胶电泳中检测, 1. 质量和浓度,溶于 5( 中 A \$ % b 保存。

### 2.2 引物设计与' - ) 扩增

参考长牡蛎 1># FOA3A!2 基因 D 1. 序列(NCBI Y: EF 登录号. U \$ ! 88), 在长牡蛎基因组范围内设计能扩增出 = " & KJ 的! 对特异性引物(5' NQ&A5' NQ ) (见表 3)。' - ) 反应程序: 8 b 变性 B ? < E; 8 b 变性 & ? < E, 退火温度 B \$ ! =! b & ? < E, " \$ b 延伸 & ? < E, # B

表 2! B 个长牡蛎家系生长数据和糖原含量

5 KRQ&! 5 HQ; VaTHIT: G: 日! NRDAQ&DVEICET! VMMZQ 19: (: 42>!) > < ! W ? QGS

家系/样品数	壳高/??	壳长/??	壳宽/??	总重量\	软体部重\	糖原含量
O ? QJ/EP?KQ	4-ORRH-C&HT	4-ORRE-ENTH	4-ORR-aGTH	5M: RaC&HT	4MVAKSSFO	NRDAQ&DVEICET
1# (10)	"! < \$ h & \$ !	! = < \$ h % < 8	\$! < B h % < B!	! # < ! h & < #!	% < & h % ? # !	# = \$ \$ h & & #
2# (10)	" & #! h & \$ !	! B B h % < 8	\$ \$ < B h % < B!	## < # h & < #!	% < = h % ? # !	# % \$ \$ h & & #
3# (10)	" = < B h & # \$ !	! B B h % < 8	\$ # < B h % < B!	## < & h & < #!	% < B B h % ? # B	# % & ' h & & >
4# (10)	" # < & h & # \$ !	! B B h % < 8	\$ = < B h % < B!	!! < B h & < !!	% < < \$ h % ? % !	\$ B # B h & \$ & &
5# (10)	" & % B h & \$ !	! B B h % < 8	\$ \$ # B h % < B!	\$ B < # h & < B	% < B B h % ? # !	# = < B h & &

表 3! 引物序列

5 KRQ\$! 4Q RQED&VW[; GOS

引物名	引物序列(5' 3')	退火温度/b	产物长度/KJ	扩增位置/KJ
1: ? Q	' ; GQ! SQ RQED (5' 3')	. BEQREN TO? [Q: TPQ	/ < ENTH	^ < DTGE
5' NQ&A!	5- 5- - - - N5- - N. - . . - 5- 5B	=%	8BB	! % & B B B
5' NQ&A!	N5NN. N- . N- N5- 5N. - - 555N			
5' NQ\$! A!	555N55N5- 5N- NN- 5. 5N. . 5	=!	\$ B &	= \$ ! > ' %
5' NQ\$! A!	5555NN555N. . NN. - 5- - - 55			
5' NQ#A!	. N5- 55. 5- . 5- 5N5N5NN55N	B!	& & !	> & ! 8 "
5' NQ#A!	55- 5. - . N. 5. . 5NN. - -			
5' NQ! A!	5. - - 5- . . 5NN5- 5N- - . - -!	B!	8 B!	& # & ! & ! =
5' NQ! A!	- - - 5- 5. 5- - - 5N- - - 5.			

个循环;"\$ b 延伸, 循环结束后! b 保存。整个反应用体系: 1. 模版, 引物, 聚合酶(5c:), 产物用琼脂糖凝胶电泳检测, 并用的溴化乙锭染色。

#### 44' 电泳及测序

向扩增片段与目的片段大小一致且特异性好的产物中加入等量变性剂(去离子甲酰胺, 二甲苯菁, 溴酚蓝, 0.5%), 变性后立即冷却, 直至上样时取出, 以防止复性。电泳采用丙烯酰胺/1, 1jA 甲又双丙烯酰胺(8:1)的非变性聚丙烯酰胺凝胶, 置于! b, 以3 电泳! & H 后银染。结合 44' 条带分型, 随机选择# 个以上具有相同电泳条带的个体进行纯化测序, 从而确定各个体的基因型。

#### 数据 分析

采用 4 统计分析软件 N/9 模块进行统计, 并采用 VEG 多重比较分析各个 41' S 及其单倍型与生长性状的关联性。对于多位点 41' 单倍型与性状的关联分析, 首先利用 7. 4(\$ 软件将与性状相关联的 41' S 构建单倍型, 再通过构建一般线性模型:  $Q^{\wedge}\mu\_F, \#\_DQ$  是性状观察值,  $\mu$  是群体表型均值,  $F$  是个体基因型效应,  $\#$  是单倍型效应,  $D$  是随机误差)分析各基因型及其单倍型的差异显著性(差异显著 C' %2B, 极显著 C' %2& )。

### \$! 结果与分析

#### \$& 基因型鉴定

本研究成功设计了! 对特异性引物, 扩增出覆盖 1>M FOA3A12 基因 D 1. 全长的 " & K 的基因组, 1. 片段, 共检测到的! 个 41' 位点( !" &、5' \$-、"! &N、" >N) 均位于编码区, 且都为无义突变, 其中在 5NO\$ 中检测到# 个 41', 在 5NO& 中只检测到& 个 41', 其余片段均未发现 41'。5NO& 和 5NO\$ 两对引物(-) 扩增产物的 44' 电泳带谱如图& 所示。

#### \$- 长牡蛎 1>M FOA3A12 基因多态性与经济性状的关联分析

!! 通过显性遗传效应模型分析, 发现长牡蛎 -\ 5NO1)!\* 基因中有# 个 41' 与长牡蛎生长性状和糖原含量相关(见图\$)。# 个 41' 位点在 B 个家系中各等位基因的频率如表# 所示。因为家系间的差异, 导致有的家系只有一个等位基因, 同时在# 个家系检测到哈迪温伯格平衡的偏离, 可能与不同基因型的个体存活率存在差异有关。表! 显示了 1>M FOA3A12 基因

# 个 41' 与生长性状和糖原含量关联分析的结果。在位点 5' \$-、"! &N、" >N 基因型个体的壳长和软体部重均显著高于基因型为 55 的个体(C' %2B)。在位点、N 基因型个体的生长性状指标和糖原含量均显著高于 NN 基因型的个体(C' %2B), 其中 N 基因型个体的壳宽、总重量和软体部重极显著高于 NN 基因型(C' %2&)。在位点" >N, N 基因型个体的糖原含量显著高于 NN 基因型的个体, 而壳高显著高于 N 基因型的个体(C' %2B); NN 基因型的个体在壳长、壳宽、总体质量和软体重方面均显著高于 N 基因型的个体(C' %2&)。5' \$- 和"! &N 位点仅存在\$ 种基因型, 可能是由于基因与环境的互作效应导致相关的基因型在自然选择过程中被逐步淘汰; )。)、(、、。、、

表 #! 长牡蛎 1>A

7#(5N)单倍型的个体均显著低于其他B种单倍型的个体,而且7(5.N)和7(-.N)单倍型的个体显著高于7(5NN)、7#(5.N)和7B(-NN)这#类单

倍型的个体(C' %2B),其中在软体部质量方面,仅7(-.N)和7B(-NN)\$种单倍型的个体间存在显著差异(C' %2B),其余均为极显著差异(C' %2&).

表B! 1># FOA3A12 基因单倍型与长牡蛎生长性状与糖原的关联分析

5 KROB! . SMOETGAEKCaOEIH [RTU]CSW1># FOA3A12\OEQ: E! \ VaTHIT: G: E! NRJACEDAEIET!W1 N><

单倍型	41' 位点 /NPS	频率	糖原/@	壳高/??	壳长/??	壳宽/??	总重量/\	软体部重/\
7: [RA	5'A . "A . "A	(样本量)	NRJACE	4OR	4OR	4OR	5M:R	4WATSSPO
TUQ	\$=- !&N>=N	OQPQEDJ(%)	DVEIET	HOSHT	REYTH	aGTH	aOSH	aOSH
7&	5 . ! N	\$#&@(&#)	!%\$! h\$<=": " ! \$! h\$<EKD	" #! h\$<%"	\$' % h&\$\$	!= \$#h#&E	" #Bh%EB	
7\$	5 N! N	"8B@(&B)	#\$%&h%t#K	"&#Bh%t":	!B%h%##	\$ % h%\$% #! %Bh%<#A	! #h%&E	
7#	5 N! .!	" \$ @(!=)	#=- B\$h%t\$D =8%h&EB	!&%" h&E%K	\$&#\$h%<E	\$' %&h%\$%D	#B-h%\$%D	
7!	- . ! N	\$BB@(&B)	#B<Bh\$<=":K"" & h\$< >D	!>\$-h&2B	\$B<=" h&E%:	!= #h#&E	=<! h%t":	
7B	- N! N	>#\$@(&B)	#\$%&h%&B" &<>h&t":K	!= #>h&E%:	\$B<Bh%<E" #! \$&h&E"K	B#\$h%\$%K		

注:同一列不同上标字母表示41'单倍型各性状的差异显著性(C' %2B)。

1VQ: 3 RPS!aGH!QWQET!SF!QSDQ!RTQSaGH!E: !DAP?E!WQZU41' !H [RTU]Q; QSSKQGEERJ!QWQET: T!%&BRZK<

### #! 讨论

遗传变异是水产动物进行长期遗传改良的基础,因此保护和有效利用遗传资源对水产养殖业的可持续发展有重要意义[6]。一般而言,对于长牡蛎这类具有群居习性且繁殖力强的有效群体来说极有可能有丰富的遗传多态性。刘思玮等[8]在糖原磷酸化酶基因的研究中检测到的41'平均密度为&/\$B,-VE等[6-8]在长牡蛎胰岛素受体相关受体基因(2AA)的多态性研究中发现上述基因的41'平均密度为&/>%,在长牡蛎胰岛素相关多肽基因(R2AC)中41'平均密度为&!%。本研究在共"=&K的长牡蛎生长转化因子受体基因中共检测到!个41'位点,41'平均密度为&/&E"K,明显低于之前的研究结果。而且在栉孔扇贝!FOA3A12受体基因的非编码区中也仅筛查到&个41' [6]。导致!FOA3A12受体基因单核苷酸多态性如此低的原因可能是由于自然选择对于基因的选择作用,也可能是由于该基因在进化上相对保守使得变异度降低。因此,针对不同的基因而言,41'的频率不尽相同,需要综合考虑各方面的因素。本研究中41'频率较低可能是由于候选基因本身存在差异性,并且也应考虑基因和环境的互作效应。检测到的41'位点在部分家系中由于缺乏多态性,无法检测到与表型的相关性。这可能是因为从各家系中选取的\$龄长牡蛎,由于不同基因型个体生存能力不同,从而导致部分家系中等位基因多态性的缺失以及哈迪温伯格平衡的偏离。长牡蛎较高的遗传负荷,在以往的研究中已有报道。/: FEQJ和7Q\QDF [8]发现偏分离比例在长牡蛎早期幼虫阶段

最低,随着生长发育而逐渐增加,指出高遗传负荷是导致偏分离增加的原因,并且支持某些等位基因由于和致死基因连锁而受到选择的理论。由于家系间基因型存在显著的差异,利用单个家系难以检测到基因型与表型的相关,因而本研究中将各家系合并成混合群体进行41'及其单倍型与生长性状的关联性分析。然而,采用遗传背景差异较大的家系组成的混合群体,可能会产生群体分层现象,一定程度上干扰关联分析的准确性。

相关研究表明,5NQ1信号通路可以诱导特定类型细胞生长的停滞[9A&]。特别是在肌细胞中通过抑制肌细胞特异基因的表达,进而抑制肌肉形成。目前,在长牡蛎1>#FOA3A12基因研究中,发现该基因在各个发育时期都有表达,其中唇瓣和鳃中的表达量相对较高[8]。在相关!FOA3A12基因研究中,发现栉孔扇贝和长牡蛎中可能存在与哺乳动物类似的5NQ1信号通路,而且分析出5NQ1!\*表达量和横纹肌量的负相关性[6-7]。以上研究都表明了!FOA3A12基因不仅在在动物体的各个发育时期都具有功效,而且对于肌肉生长调控发挥重要作用。因此,查找1>#FOA3A12基因编码区41'可以全面分析基因多态性在影响蛋白修饰过程中的作用,进而将会更有效地研究该基因与生长性状的相关性,有利于从分子生物学方面对长牡蛎早期苗种进行选择,进而发挥分子标记在辅助育种技术中的作用。

本研究通过对长牡蛎B个家系共#&=个个体的生长性状和糖原含量与1>#FOA

联的 41' 位点(5' \$=, " ! &N 和 . " >=N)。所检测到的 41' 位点均并未引起氨基酸的改变。此类同义多态性可能通过影响?) 1. 的拼接、稳定性、结构和蛋白质折叠,从而间接影响蛋白质的功能[57]。也会通过控制转录来影响基因的表达水平。这# 个 41' 位点构建成的B 个 41' 单倍型中,7&(5. N)和 7! (- . N)单倍型个体的总体量和软体部重(分别为! =<#&! =<8%和 " <#B.=<!)均显著高于其它# 种单倍型 7\$(5NN)、7#(5. N)和 7B(- NN)的个体(C' %&B),表明 7&(5. N)和 7! (- . N)单倍型是对长牡蛎的生长最为有利的单倍型,证实了在长牡蛎的转化生长因子受体基因对于长牡蛎生长发育具有极为重要的作用。在糖原含量方面,7&(5. N)单倍型的个体显著高于 7\$ 和 7B 单倍型的个体,表明该基因可能参与糖原含量的调控,为确认这种关系的可靠性,需要进一步分析该基因在调节糖原代谢中的生理作用。

### !! 结论

本实验研究了长牡蛎 - \A5NOA1)! \* 基因多态性,获得了# 个与生长性状相关的 41' 位点,并首次证实了单核苷酸多态性影响长牡蛎生长性状和糖原含量。在获得的B 个单倍型中,发现 7&(5. N)单倍型相对有利于长牡蛎的生长,为今后分子标记辅助育种技术的应用提供了有力的工具。同时,证实了编码区的基因突变会导致生长性状的变化,从而表明 1># FOA3A!2 基因可作为候选基因来应用于今后长牡蛎的遗传改良。

### 参考文献:

[&! 李翠玲<转化生长因子<sub>1</sub> 分子生物学研究进展[L]>国外医学免疫学分册, 88B, &>(#): 88B A8B' < /G-! / <5: ESW ?GEN \ VaTHW DV ! KCF ! ; SQ: DH [; V: CSB W ? VA RDPR ; ! KGR AU [L] <O / O E ! 9 O G R 4 G E D S 4 D G E W ? ? F E V A \ U , 88B , &> (#) : 88B A8B' <

[\$!] 7P' ! , , : TIV ! 9 ! Y , M E N ! O ! O < 9 V RDPR ; ! ? O H E S ? S W W ; E S A W ? G E N \ VaTHW DV A<sub>1</sub> S S E R E [L] <(E V D C E Q) O X G a S , 88B , &> (#) : # 8#=# <

[#!] 李京红<转化生长因子<sub>1</sub> 受体研究进展[L]>国外医学生理、病理科学与临床分册, 88B , &> (&) : \$>#% < /G! 7 <5: ESW ? G E N \ VaTHW DV ! KCF ! ; SQ: DH [; V: CS < W A O E ! ? Q G R S G E H O S [L] <' : T H [ H U S V A U : E ! - R E C R 9 O G E Q 88B , &> (&) : \$>#% <

[!] O E ! 7 , f H V ! U / , / G P L I M , O I : R < N R D A C E S U E T H S Q F E S Q # 1 E Q : G Q U ; Q P R T C S 5 N O 1 & ; E ! . E V C E S E \*\* A ? Q G T O ! D O R P R ; : D G U T H V P H C E Q : D C E ! a G H 4 ? : 1 # [L] < 9 V RDPR ; ! : E ! - O R P R ; ' H ; ? : D R A U , \$ % & % = ! ( & # ) : & A # <

[B!] , : G - ! 4 , M O E ! O ! 6 , 7 Q M ! - . O I : R < \* E H C G C V E W W ; V E A R ? ? : T V U ) . 15 ( 4 Q [ ; S S V E K U 5 N O 1 & S I ? Q G T O ! K U N R D A C E S U E T H S Q F E S Q # 1 # Q C E I E T 1 A D T C E S S E R E [L] < L V P E R W V G R A G R

- H O A C S F U , \$ % & , \$ - > ( 8 ) : " % B S A " % B < [ = ] ! N P M 7 ! 7 , Y : M f ! 9 , / G L d , O I : R < 9 V RDPR ; ! D H ; : D O C X T G A W W 5 N O 1 T U [ O ! ; O O T V ! N C E Q ( ! > J 7 . 2 7 7 6 4 2 5 . 4 9 2 1 2 T @ ( D ) 4

[\$&]! 9.SS\PK.L.4Q/EQL.MMTVEI, <4?:!IT:ESDGTGEWDOVSL] <  
 NDCS!g, QZM[?CET, \$%B, 88: '\$!#/\$%&<  
 [\$]\$! /QVE\!- .Y.I.;VTGO. dPk:k 7!/. QI:R<- \A5NO1. :!5NO1/  
 :DGEHV?VAPDGH THQ' :DGEVUSQ! 19: (:4D!>>< .SCEA  
 ZPQ!GEG?FEQU: \GEST!N: ?AEQ. TQZ?GVMGREWQVE[L] <

, QZM[?CET:R: E!-V?[:;: TQZ\*??FEVRAU. \$%%. #&: #/##><  
 [\$#]! 7FEN! , 4 FE !f!(, . ?KRF; !4!3. QI:R<4RET (SLELU?VPS)  
 41' S: SHVR !aQD; Q: KPI THQ? ? [L] < 9CHM \$GE! 9VRDPR;  
 YGRAU. \$%B. B: \$##/8<

## Polymorphism of Transforming Growth Factor $\beta$ Receptor' Gene and Its Association with Growth Traits and Glycogen Content in Pacific Oyster *Crassostrea gigas*

- 7( 1!6P, /\*!dG 62!7VE\, c+1N!/GE\ACE\

(5-QcQJ/:KV:TV,UWV9;GPRPO 9GCSF,UWV(I PDTGE, +DDE!2EQOSSUWV-HE , dEN:V.\$=%#, -HE )

Abstract: ! MQZ RP: TO! THQWQD! WTHQ[VU?V[HS?!WV' :DGEVUSQ (19: (:4D!>>< ) T: ESW/A  
 ?GEN\ VaTHWQDV 1; QQTV! \*! \EQ (1>! FOA $\beta$ A!2) VETHQ\; VaTHIT: GS: E! NRDAQEDVETET! THVPH  
 ' -) A44 ' !: ERSS<' VU?V[HS?!WV1>! FOA $\beta$ A!2 a: SQ: ?EQ!W!GS: SMDTVE! aGHITHQ\; VaTH  
 [QW? : EQ (SHRHO&H, SHORREXTH, SHORaGTH, TV: RaQ&H! : E! SWATSSPQaQ&H) W#&= VUSQ  
 GEGP: SWV?! WZQVRSK W? QSS<QV! SE PDEPDTGQ[VU?V[HS?S (41' S) aQQ: QZPQ! GE  
 ="&K! W1>! FOA $\beta$ A!2 \EQ< +WTHQ?, TaM. 41' S ( " ! &N: E ! ! " >=N) aQQSSQWDEIRJ: SMDTQ  
 aGHITHQ\; VaTHIT: GS: E! NRDAQEDVETET (C' %B), aHQD EVTHQ!VEQ (5' \$=-) SSQWDEIRJ: SMDQ  
 : TO! aGHISHORREXTH: E! SWATSSPQaQ&H<QPTHQ?VQ: ?VEN THQWQ41' !H [RTU]SDVEST; PQQ  
 PSEN THQWTHQ41' S, THQTV: RaQ&H! : E! THOSWATSSPQaQ&H! WTHQCEGEP: SaGHITHQH [RTU]Q  
 7&(5. N): E !7! (-. N) W1>! FOA $\beta$ A!2 a: SSWQWDEIRJ, HSHQ! THBTHSQaGHITHQVTHQ! THQ (C'  
 %B), SP\SCEN TH! THQ TaM [RTU]S!?: UKOTHQ?VSI: IZ ET: \QPSQEQ?SWWQ&H! \; GEG 1 N  
 >>< .: E !?: USQZQ: S\CEQEQ?;: FQSW!WST! \; VaTH!GEVUSQ!K QDGE\ <

Key! words: ! 19: (:4D!>>< ; T: ESW ?GEN\ VaTHWQDV 1; QQTV! \*! \EQ: \ VaTH [QW? : EQ  
 VRDAQ; 41' S

责任编辑! 朱宝象